

	PREPARO PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA	IDENTIFICAÇÃO FM.ENDOS.012	
		VERSÃO 01	REVISÃO Maio/2026

NOME DO PACIENTE:

DATA DE NASCIMENTO:

DATA DO PROCEDIMENTO:

HORÁRIO:

MÉDICO EXECUTANTE:

VÉSPERA DO EXAME

- Não ingerir leite, evitar comer carne vermelha e realizar uma alimentação leve;
- **Jejum absoluto a partir das 23:00h (alimento e água);**
- 22:00h tomar 40 gotas de luftal (simeticona).

NO DIA DO EXAME

- Antes de sair de casa/ou do setor tomar 40 gotas de luftal (simeticona);
- Suspende insulina ou medicação oral para diabetes;
- Caso o paciente não faça uso de antibiótico, administrar kefazol 2G uma hora antes do procedimento (procedimento realizado dentro do ambiente hospitalar).

OBRIGATÓRIO:

- Comparecer ao exame com acompanhante maior de idade (o acompanhante deverá permanecer no setor durante todo o procedimento);
- Pedido médico original;
- Documentos de identificação pessoal com foto (RG ou Carteira de Habilitação);
- Carteirinha do convênio (se for o caso);
- Guia ou autorização prévia do convênio (quando necessária);
- Exames recentes: hemograma, coagulograma e eletrocardiograma.

RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES

- Chegar com antecedência de 30 minutos para cadastro e pré-exame;
- Evitar unhas grandes e esmalte de coloração escura nas unhas das mãos (prejudica a leitura do aparelho que verifica o nível de oxigenação no sangue e os batimentos cardíacos);
- Utilizar sapato baixo e antiderrapante;
- Deixar quaisquer pertences pessoais com um acompanhante durante a realização do exame, incluindo carteira, bolsa, óculos, bijuterias, joias, relógios e celular;
- Trazer o nome de todos os medicamentos em uso;
- Se estiver usando medicamentos para pressão arterial ou coração, poderá tomar normalmente a medicação, com pouca água (apenas para engolir o medicamento) às 06:00h da manhã;

	PREPARO PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA	IDENTIFICAÇÃO FM.ENDOS.012	
		VERSÃO 01	REVISÃO Maio/2026

SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS

- **Medicamentos que não precisam ser suspensos:** ASPIRINA, AAS, BUFERIN, NAPROXENO, GUNKGO BILOBA, SOMALGIN, DICLOFENACIO, OUTROS AINES.
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 6h antes do procedimento:** AGRASTAR (TIROFIBANA), INTEGRILIN (EPITIFIBATIDE), HEPARINA IV, HEPARINA SC.
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 12-24h antes do procedimento:** ENOXOPARINA (CLEXANE), NADROPARINA (NADROPARIN/FRAXIPARINE), ABCIXIMAB REOPRO, DESIRUDIN (IPRIVAK);
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 48h antes do procedimento:** ORLISTATE (XENICAL), LIRAGLUTIDA (VICTOZA/SAXENDA/XULTOPHY), DAGIGATRANA (PRADAXA), RIVAROXABAN (XARELTO), APIXABANA (ELIQUIS), ENDOXABAN (SAVAYSA), FONDAPARINUX ARIXTRA, DIPIRIDAMOL (PERSANTINE), CILOSTAZOL (PLETAL);
OBS: se Insuficiência Renal Crônica (IRC), suspender por 5 dias.
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 48h antes do procedimento:** LIRAGLUTIDA (VICTOZA, SAXENDA, XULTOPHY);
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 5 dias antes do procedimento:** CLOPIDOGREL (PLAVIX/ISCOVER), FEMPROCUMONA (MARCOUMAR), TIENOPIRIDINAS (PRASUGREL/EFFIENT), TICAGRELOR (BRILINTA), WARFARINA (MAREVAN/COUMADIN);
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 10 dias antes do procedimento:** TICLOPIDINA (TICLID);
- **Medicamentos que precisam ser suspensos 21 dias antes do procedimento:** SEMAGLUTIDA (OZEMPIC, RYBELSUS), DULAGLUTIDA (TRULICITY), TIRZEPATIDA (MONUNJARO).
OBS: Em caso de problemas cardíaco deve ser informada ao seu cardiologista e solicitado um relatório apresentando a liberação para realização do exame.

COMO É REALIZADO O EXAME?

A gastrostomia endoscópica percutânea é um procedimento com duração média de 30 minutos, realizada com o paciente deitado e sedado, após a sedação, o médico irá introduzir o endoscópio (tubo flexível bem fino, com luz e microcâmera na ponta) pela garganta, é criada uma pequena abertura através da pele do abdome superior para o interior do estômago com o auxílio da endoscopia. Através desta abertura, a sonda é inserida e fixada.

CONTATOS:

(79) 2107-6400 (Hospital Renascença).